Purolyt

Exemple de plan de gestion de l'hygiène

ANOLYT PUR 100% AUCUN ADDITIF CHIMIQUE

UTILISATION	SEMAINE DE CROISSANCE				SEMAINE DE FLORAISON						
	Propagateur	**1.**	**2.**	**3.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6. – Dernière semaine**	**Nettoyage basique**
Désinfection des mains	Avant tout contact et lors du changement de pièce										
Purolyt pour désinfecter les surfaces et l'air (pulvérisation / atomisation)	4 x par semaine 20 ml/L	3 x par semaine 20 ml/L					2 x par semaine 20 ml/L				20 ml/L
Purolyt pour désinfecter les outils et les appareils (pulvérisation / immersion)	Avant et après chaque application : 20 ml de Purolyt par litre										
Purolyt pour désinfecter le réservoir d'eau, température de service < 23 °C (ajout direct)	Preventive: 2 x par semaine 5-10 ml per 10L										40 ml/10L
Purolyt pour désinfecter le réservoir d'eau, température de service < 23 °C (ajout direct)	Preventive: 1 x par semaine 5-10 ml per 10L										40 ml/10L
Purolyt pour désinfecter / recycler les substrats inertes (trempage)	Avant chaque période de croissance 10 ml/L										
Retirer les matières végétales mortes	Sans délai										
Passer l'aspirateur	Hebdomadairement										
Nettoyer le filtre d'air entrant	Mensuellement										

Remarque : La pulvérisation ou la vaporisation doivent toujours avoir lieu à la fin de la phase d'éclairage, en présence d'une quantité minime / réduite de lumière. Éviter l'exposition aux rayons solaires et à la lumière ultraviolette.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRETÉ EST SÛRETÉ

www.purolyt.ch